

NAVODILA ZA PACIENTE:

MR ENTEROGRAFIJA

PRED PREISKAVO DOMA:

- Vsaj 4-6 ur ne jejte solidne hrane, dan pred preiskavo je priporočena lahko prebavljiva in manj mastna hrana.
- Normalna hidracija z navadno negazirano vodo, prepovedano je piti gazirane pijače.
- Vzamete vsa zdravila, ki jih redno jemljete (sladkorni bolniki na inzulinu potrebujejo prilagojen odmerek inzulina, naj nas na to opozorijo).

PRED PREISKAVO PRI NAS:

- Pitje 1000-1500 mL 2,5% Sorbitola po sledečem režimu: 60 minut pred preiskavo, 1 kozarec vsakih 5 minut.

MOŽNE/PRIČAKOVANE TEŽAVE MED IN PO PREISKAVI:

- Driska po Sorbitolu – bolniki naj pridejo na preiskavo s spremstvom, naj ne vozijo sami domov, še posebej če so dlje oddaljeni od doma.
- Lahko slabost s siljenjem na bruhanje in krči v trebuhu po zaužitem Sorbitolu.
- Prehodno slabši oziroma meglen vid (težave z akomodacijo očesne leče) po prejetju butilskopolamina – tudi zato bolniki naj pridejo na preiskavo s spremstvom, naj ne vozijo sami domov.
- Drugi pogosti (antiholinergični) neželeni učinki po butilskopolaminu: razbijanje srca, suha usta, prehodna nezmožnost odvajanja urina.